

**HP400** è un **fisioattivatore** esclusivo a base di un mix di proteine di origine batterica ottenute da fermentazione di ceppi selezionati. **HP400** agisce come molecola segnale stimolando specifici recettori presenti sulle foglie, accelerando e amplificando i processi metabolici legati alla fase fenologica in corso. La massima espressione di **HP400** la si ottiene su colture ben equilibrate e nutrite in quanto la sua risposta sistemica deve essere sostenuta da tutti gli elementi nutritivi necessari.

## COSA CONTIENE

Proteine $\alpha\beta$	1 %
Coformulanti q.b. a 100	



**CONFEZIONE**  
200g

## i VANTAGGI di

## HP 400

Anticipa ed uniforma la maturazione


Garantisce l'aumento della resa

Migliora la qualità anche con elevati livelli produttivi

Aumenta la pezzatura

Incremento del grado Brix





INSALATE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
Da post trapianto:  
100-200 g/ha  
Numero interventi: 2-3  
Intervallo minimo: 7-10 giorni



POMACEE  
E DRUPACEE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO


**Applicazione fogliare:**  
Da allegagione 150g/ha  
Numero interventi: 4-6  
Intervallo minimo: 14-20 giorni



TABACCO

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
Da 30 giorni dopo il trapianto:  
100-120 g/ha  
Numero interventi: 2  
Intervallo minimo: 14-20 giorni



ACTINIDIA

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
Da inizio ingrossamento frutto:  
300 g/ha  
Numero interventi: 4  
Intervallo minimo: 15-20 giorni



FLORICOLE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO


**Applicazione fogliare:**  
Da sviluppo vegetativo a  
fioritura: 100-200 g/ha  
Numero interventi: 2-3  
Intervallo minimo: 10-14 giorni



VITE

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
Da inizio invaiatura: 200g/ha  
Numero interventi: 2  
Intervallo minimo: 10-14



POMODORO  
DA INDUSTRIA

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
**In pre trapianto** 20g/10L  
su piantine,  
**Da fioritura primo palco** 50g/  
ha  
Numero interventi: 5-6  
Intervallo minimo: 7-14 giorni  
**Invaatura 50-70%** 100g/ha  
Numero interventi: 1



POMODORO DA  
MENZA, PEPERONE E  
MELANZANA

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
**In pre trapianto**  
20g/10L su piantine,  
**Da fioritura primo palco**  
100-200 g/ha  
Numero interventi: 4-8  
Intervallo minimo: 7-14 giorni



FRAGOLA

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
Da pre-fioritura 50-100 g/ha,  
Numero interventi: 6-8  
Intervallo minimo: 7-10 giorni



ZUCCHINO E CETRIOLO

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
**In pre trapianto**  
20g/10L su piantine,  
**Da post trapianto** 50g/ha  
Numero interventi: 6-10  
Intervallo minimo: 7-10 giorni



MELONE,  
ANGURIA E ZUCCA

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

**Applicazione fogliare:**  
**In pre trapianto**  
20g/10L su piantine,  
**Da post trapianto** 100g/ha  
Numero interventi: 3  
Intervallo minimo: 7-14 giorni

Le dosi sono da intendersi indicative, verificare il dosaggio consultando il catalogo sul sito [www.sipcam.it](http://www.sipcam.it)