



AZOSUPER® N20

LINEA AZOMAT

Matrice Organica da
Miscela umificata
di letami (letame
bovino)



Pelli e crini



Urea



Solfato
ammonico



0%

Pennone

100%



PACKAGING SACCO kg 25 su pallet da kg 1500
BIG BAGS kg 500
SFUSO

TRE
DIFFERENTI
FORME DI
AZOTO

CESSIONE
DELL'AZOTO
A BREVE
E MEDIO
TERMINE

AZOSUPER® N20 / Caratteristiche:

- **Forma fisica:** pellet omogeneo di forma cilindrica con diametro medio di 3 - 4 mm e lunghezza media di 4 - 5 mm.
- La sua specifica composizione organica lo rende maggiormente apprezzabile rispetto ai concimi organo-minerali azotati ad alto titolo "monomatrice": es. cuoio, cuoiattoli, cornunghia tal quale, ed altri ancora.
- La contemporanea presenza di letami e pennone garantisce: copertura delle esigenze nutrizionali da subito grazie all'urea, nutrizione che perdura nel tempo (3/4 mesi) data dalle matrici organiche, capacità di stimolare l'attività di m.o. nel terreno causa la sua componente organica diversificata.
- Le caratteristiche originarie non vengono alterate da nessun processo di lavorazione a caldo (es. essiccazione artificiale).
- Il prodotto si presenta molto asciutto e facile da spargere con qualsiasi spandiconcime.
- Prodotto che, per le matrici che lo compongono, è maggiormente indicato su colture a ciclo medio/lungo e con elevate esigenze azotate.







Il rilascio dei nutrienti contenuti nelle sostanze organiche impiegate in **AZOSUPER® N20** è graduale (vedi disegno della curva di mineralizzazione).

CONTENUTI MEDI SULLA SOSTANZA TAL QUALE

Azoto (N) totale	20%
Azoto (N) organico	2,5%
Azoto (N) ammoniacale	5%
Azoto (N) ureico	12,5%
Anidride Solforica (SO ₃) solubile in acqua	12%
Carbonio (C) organico	10%
Sostanza organica	28-32%

Umidità (H ₂ O)	10-12%
MICROORGANISMI (calcolati per UFC/g)	
Carica batterica aerobica totale	432.000.000
Carica batterica anaerobica totale	343.000.000
pH (indicativo)	7-7,5
Peso specifico	1,1-1,2 kg/l

DOSI MEDIE DI IMPIEGO SUGGERITE PER LA NUTRIZIONE DELLE COLTURE

COLTURA	EPOCA	DOSI	INDICAZIONI
CEREALI AUTUNNO VERNINI 	Pre-semina oppure alla copertura in accestimento	700-800 kg/ha pieno campo 400-500 kg/ha pieno campo	Interrare il prodotto con l'ultima lavorazione se possibile operare la strigliatura
MAIS 	Pre-semina oppure in copertura alla 6° foglia	800-900 kg/ha 500-600 kg/ha	Interrare il prodotto con ultima lavorazione sarchiare
GIRASOLE 			
PRATI 	Pre-semina o in copertura	70-120 g/m ²	Distribuire il prodotto, rullare ed irrigare

ALTRE COLTURE

COLTURE FORAGGERE 	copertura alla ripresa vegetativa	400-600 kg/ha	irrigare, oppure strigliare
COLTURE ORTICOLE 	Pre-semina o trapianto	400-500 kg/ha in banda di 50 cm oppure 600-800 a pieno campo	Interrare il prodotto; con ultima lavorazione

Le colture indicate sono rappresentative di ogni categoria; AZOSUPER® N20 trova applicazione per molte altre specie con medesime modalità di utilizzo.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell'intero piano di concimazione.

Il prodotto non deve essere messo a contatto con le radici e il fusto della pianta. Prodotto solo per uso professionale.
➔ **Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.**

**Tenere in
luogo asciutto
e riparato**



I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

 **Smaltire
in modo
corretto gli
imballi**



FOMET - Via Vialarga, 25
37050 S. Pietro di Morubio (Vr) ITALY-UE
Tel. 0039 045 6969004 - Fax 0039 045 6969012
fomet@fomet.it - www.fomet.it