MYR MICRO

Concime liquido con microelementi 9%

MYR MICRO è un concime liquido appositamente studiato per prevenire e curare le microcarenze e per migliorare lo sviluppo e la qualità della produzione, apportando in unico intervento i più importanti microelementi. Questo permette un grande risparmio di tempo e di denaro. La sua efficacia deriva dal fatto che i microelementi (Boro, Ferro, Zinco e Manganese) sono chelati con acido gluconico e aminoacidi levogiri di origine vegetale, risultando così facilmente assimilabili e traslocabili all'interno della pianta.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	2,4%
Boro (B) solubile in acqua	0,6%
Manganese (Mn) solubile in acqua	3,2%
Zinco (Zn) solubile in acqua	2,5%
Azoto (N) organico	1,1%
Aminoacidi vegetali	6%
Sostanza organica	20,0%
pH	4
Peso specifico	1,36 kg/L

VANTAGGI

- prevenzione e cura di microcarenze
- miglioramento dell'allegagione e riduzione cascola
- miglior sviluppo e colorazione dei frutti
- aumento della qualità della produzione
- maggior resistenza a sbalzi termici e malattie
- azione nutritiva e antistress
- rapporto equilibrato tra i microelementi
- riduzione del numero di interventi
- miscibile con i più comuni agrofarmaci

COLTURA	DOSE	MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dalle prime fasi vegetative o al manifestarsi delle microcarenze
FRUTTICOLE	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dalle prime fasi vegetative o al manifestarsi delle microcarenze
OLIVO	12 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dalle prime fasi vegetative o al manifestarsi delle microcarenze
AGRUMI	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dalle prime fasi vegetative o al manifestarsi delle microcarenze
ORTICOLE	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dal post trapianto o al manifestarsi delle microcarenze
FRAGOLA	1,5-2,5 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dal post trapianto o al manifestarsi delle microcarenze
FLORICOLE E VIVAI	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dal post trapianto o al manifestarsi delle microcarenze
COLTURE INDUSTRIALI	1-2 L/ha	2-3 trattamenti a intervalli di 8-12 giorni a partire dal post trapianto o al manifestarsi delle microcarenze