BOMOCLASTER

CONCIME CE

Concime minerale composto fluido
Soluzione di concime PK

Incrementa la resistenza agli stress
Migliora le caratteristiche qualitative delle produzioni

Composizione	
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	23%
Ossido di Potassio (K_2O)solubile in acqua	15%

Caratteristiche	
Aspetto	Liquido opalescente
Densità a 20°C	1,35 kg/lt circa
Punto di congelamento	-3°C
Conducibilità elettrica (0,1%)	0,9 mS/cm
pH (20°C)	4-5

BOMOCLASTER contiene acidi gluconici, zuccheri riducenti, chitosano, acido salicilico.
Tali sostanze esplicano un'importante attività vasodilatatrice limitando in tal modo i problemi di interruzione del flusso linfatico nelle piante sottoposte a stress.

• Dosi e modalità d'impiego - APPLICAZIONE FOGLIARE

Coltura	Dose lt/ha	Epoca e modalità
Vite	3 (in miscela con fungicidi specifici a dosi minime d'etichetta)	4 trattamenti: 1) Post-fioritura 2) Pre-chiusura grappolo 3) Inizio invaiatura 4) Pre-raccolta
	4 (utilizzato da solo)	
Drupacee	3 (in miscela con fungicidi specifici a dosi minime d'etichetta)	3 trattamenti: 1) pre-fioritura 2) 18-20 gg prima della raccolta 3) 7-10 gg prima della raccolta
	4 (utilizzato da solo)	
Fragola	3 (in miscela con fungicidi specifici a dosi minime d'etichetta)	2 trattamenti: 1) Inizio fioritura 2) Piena fioritura
	4 (utilizzato da solo)	
Colture orticole	3 (in miscela con fungicidi specifici a dosi minime d'etichetta)	Durante tutto il ciclo a intervalli di 7-10 giorni
	4 (utilizzato da solo)	

Avvertenze e compatibilità: il prodotto è miscibile con i principali fertilizzanti fogliari della linea Euro TSA, migliorandone la penetrazione e la traslocazione nella pianta. Il prodotto è inoltre compatibile con tutti i più comuni prodotti fitosanitari eccetto gli olii minerali, i polosolfuri e Dimetoato). Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi indicate in etichetta e di rispettare gli intervalli applicativi riportati. Per tutte le varietà di nuova introduzione o in mancanza di precedenti esperienze specifiche si consigliano prove preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all'intera coltura.
Omogenizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto non presenta problemi formulativi se immagazzinato tra 0°C e 40 °C

Confezioni	
Flacone	1 kg
Taniche	6 kg
Taniche	30 kg
Tank	1200 kg