LIXOR® GRO

Fertilizzante fluido in sospensione concentrata a base di Fosforo, Potassio e Rame chelato (3-28-13)

Si tratta di un concime liquido in sospensione concentrata ad alto contenuto di Fosforo e Potassio, al quale viene addizionata una frazione minima di Rame chelato EDTA. Il Fosforo contenuto deriva da acido fosforoso salificato con Potassio, fattore che conferisce alle piante trattate un maggiore resistenza agli stress. Il Fosforo penetra rapidamente all'interno delle piante (grazie al minor peso molecolare), consentendo alla pianta di utilizzarlo immediatamente (è più rapido a risolvere problemi di carenza). Lixor Gro manifesta anche un'azione vaso-dilatatrice che migliora il flusso delle sostanze nutritive all'interno delle piante, favorendo indirettamente l'assimilazione sia fogliare che radicale degli altri elementi nutritivi.

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale ..... 3 %
Azoto (N) ammoniacale 3%
Anidride fosforica (P_2O_5)
solubile in acqua ..... 28 %
Ossido di potassio (K_2O)
solubile in acqua ..... 13 %
Rame (Cu) solubile in acqua....0,1 %
Rame (Cu) chelato con EDTA ..0,1 %
Intervallo di pH che garantisce
una buona stabilità della frazione
chelata:.....4 - 7,5
Densità:.....1.35 kg/l

Confezioni:

6,7 kg x 4

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSAGGIO (kg/ha)	NOTE
Fruttiferi	2-3	Da caduta petali all'invaiatura del frutto. Impiegabile anche in post raccolta
Vite da vino e uva da tavola	2-4	Dalla 4°- 6° foglia fino alla fase di chiusura grappolo
***Agrumi**	2-4	Dalla ripresa vegetativa con applicazioni fogliari
Olivo	2-3	Dalla mignolatura fino all'allegagione
Kiwi	5-7	Dalla ripresa vegetativa all'allegagione ogni 10 -14 gg in fertirrigazione
	2-3	Dalla ripresa vegetativa alla fioritura e in post raccolta con applicazioni fogliari
Fragola e piccoli frutti	3-4	Dalla fioritura all'allegagione
Orticole	2-4	Dal post trapianto fino a completamento dello sviluppo vegetativo
Cereali vernini e estivi	1-2	Dall'accestimento fino alla fioritura
Leguminose e foraggere	1-2	Dalla ripresa vegetativa
Vivai e semenzai	250-400 ml/hl	Dalla emissione della 4° foglia
Tappeti erbosi	3-4	Dalla ripresa vegetativa

*Per applicazioni in fertirrigazione utilizzare il dosaggio indicato per ogni coltura moltiplicato per almeno 2/3 volte