# GOLD® K

## COMPOSIZIONE

**8%** Azoto (N) totale
2% Azoto (N) nitrico
3,8% Azoto (N) ammoniacale
1,1% Azoto (N) della Isobutilidendiurea (**ISODUR®**)
1,1% Azoto (N) della ureaformaldeide totale
0,4% Azoto (N) della ureaformaldeide solubile in acqua calda
0,45% Azoto (N) della ureaformaldeide solubile in acqua fredda
**6%** Anidride fosforica ($P_2O_5$) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
5% Anidride fosforica ($P_2O_5$) solubile in acqua

**18%** Ossido di potassio ($K_2O$) solubile in acqua
**4%** Ossido di magnesio (MgO) totale
2% Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
**27,5%** Anidride solforica ($SO_3$) totale
25% Anidride solforica ($SO_3$) solubile in acqua
0,5% Ferro (Fe) totale

A basso tenore di cloro

**Formulazione:** granulare
**Confezione:** sacchi da kg 25




**GOLD® K** è un concime composto NPK pensato per colture potassofile. Oltre che per il suo alto contenuto in potassio e magnesio, si caratterizza per il suo contenuto di azoto a lenta cessione ISODUR® e ureaformaldeide (UF). L'azoto di ISODUR® e UF è rilasciato gradualmente nel tempo, in modo da corrispondere perfettamente alle esigenze delle colture limitando le perdite nell'ambiente. Grazie al diverso meccanismo di cessione (idrolitico per ISODUR® e microbiologico per UF), GOLD® K garantisce una cessione dell'azoto continua in tutte le condizioni agro-ambientali. GOLD® K è ideale per la concimazione di ogni tipologia di coltura in quanto non contiene cloro ed è caratterizzato da una bassa salinità.

| Coltura | Epoca di applicazione | Dose (q/ha) |
|---|---|---|
| **Vite** | Inizio primavera | 4 – 6 |
| **Pomacee** | Inizio primavera | 4 – 6 |
| **Drupacee** | Inizio primavera | 5 – 7 |
| **Agrumi** | Inizio primavera | 4 – 6 |
| **Kiwi** | Inizio primavera | 5 – 6 |
| **Nocciolo** | Inizio primavera | 4 – 6 |
| **Fragola e piccoli frutti** | Pre impianto | 4 – 6 |
| **Colture orticole** | Pre impianto | 4 – 8 |
| **Floricole** | Pre impianto | 4 – 6 |
| **Vivai di piante** | Pre impianto | 4 – 6 |



**I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese**