TRIMICORR

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

TRIMICORR è un inoculo idrosolubile di funghi micorrizici e batteri del suolo che stimola lo sviluppo radicale delle piante orticole, floricole, fruttiferi, tappeti erbosi e cereali.

Applicato sul seme in concia "slurry" o sul suolo in post-trapianto il prodotto incrementa la popolazione microbica benefica in prossimità della rizosfera utile alla degradazione della sostanza organica che risulta così utilizzabile dalle radici delle piante e contribuisce a colonizzare le zone intorno all'apparato radicale rendendo più difficoltoso l'insediarsi di parassiti fungini e batterici. I microrganismi nel loro processo di sviluppo e colonizzazione forniscono spinta alle plantule emergenti, risultante in maggiore sviluppo del capillizio radicale e status nutrizionale migliore. La presenza di micorrize, inoltre agevola l'apparato radicale nell'assorbimento di elementi nutrizionali macro-microelementi e di acqua grazie alla simbiosi che si stabilisce tra microrganismo e apparato radicale.

COMPOSIZIONE (p/p)		
	Unità di misura	Valore
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato		
Contenuto in Micorrize	%	0.01% (%in peso)
Contenuto in batteri della rizosfera	g	$2x10^4$ (UFC/g)
Contenuto in Trichoderma	g	$2x10^7$ (UFC/g)

CONFEZIONI	
Barattolo	1 kg

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE	
FORMULAZIONE	polvere bagnabile
COLORE	grigio chiaro
SOLUBILITÀ in H_2O (g/l) 20°C	100
pH	5.0 ± 0.5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Coltura	Applicazione	Dose e modalità di impiego radicale
Vite da mosto e da tavola Olivo	All'impianto	2,5 kg/ha
	Al risveglio vegetativo	2,5 kg/ha
Nocciolo	All'impianto	2,5 kg/ha
	Al risveglio vegetativo	2 kg/ha
Frutticole	All'impianto	2,5 kg/ha
	Al risveglio vegetativo	2 kg/ha
	Sanificazione cotico erboso	2,5 kg/ha
Cereali vernini e primaverili (frumento tenero, frumento duro, orzo, riso, mais, triticale, sorgo, segale)	Trattamento al seme	0,5 kg/100 kg di seme
	Post-semina	2,5 kg/ha
Orticole in serra e pieno campo (pomodori, peperoni, cucurbitacee, lattughe, ecc.)	Trattamento post-trapianto poi ogni 15/20 gg secondo necessità	2,5 kg/ha
Girasole-Soia-Erba medica e altre leguminose-Colza	Trattamento al seme	1 kg/100 kg di seme
	Post-semina	2,5 kg/ha
Tappeti erbosi-Turf-Impianti sportivi	Trattamento al seme	2 kg/100 kg di seme
	In primavera	2,5 kg/ha
Floricole-Ornamentali	Dopo la semina o trapianto	2,5 kg/ha
Verde pubblico	In primavera	2,5 kg/ha

MODALITÀ D'USO

TRIMICORR è compatibile con la maggior parte degli insetticidi, acaricidi, fungicidi compresi rame e zolfo ad eccezione dei prodotti fortemente alcalini (pH >8.5).
Non alternare a interventi con: procloraz e ditiocarbammati (thiram, ziram, mancozeb).
Impiegare con volumi di acqua adeguati alla corretta bagnatura, preparare la sospensione conciante mescolando accuratamente per evitare la formazione di grumi.
Non pre-miscelare o conservare in forma diluita, la pre-germinazione non è necessaria.
Per un'azione ed attivazione rapida ed efficace miscelare **TRIMICORR** a Idrol-Veg alla dose di 10 kg/ha.
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati nè organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).