

- AUMENTA ED UNIFORMA IL GERMOGLIAMENTO
- INCREMENTA IL NUMERO DI FIORI PER GERMOGLIO
- UNIFORMA LA FIORITURA E MIGLIORA L'ALLEGAGIONE



COMPONENTI

Aminoacidi, polisaccaridi, Azoto.

CARATTERISTICHE

BLUPRINS[®] BIO è la nuova ed unica soluzione per interrompere la dormienza dell'actinidia in agricoltura biologica. Associato a **BLUACT[®] BIO** e **ZINCO EDTA**, suoi attivatori, **BLUPRINS[®] BIO** riattiva e sostiene il metabolismo della pianta, aumentando quantità e qualità del raccolto. Grazie alla sua formulazione, **BLUPRINS[®] BIO** stimola l'apertura delle gemme (riducendo il numero di quelle cieche), uniforma il germogliamento, aumenta il numero di fiori e sincronizza la fioritura. **BLUPRINS[®] BIO** non è tossico per l'operatore.

MODALITÀ DI IMPIEGO

BLUPRINS[®] BIO deve essere sempre associato a **BLUACT[®] BIO** (vedi pag. 112) e **ZINCO EDTA** (vedi pag. 70).

CULTURA	EPOCA DI IMPIEGO	DOSE			VOLUME MINIMO DI SOLUZIONE
		BLUPRINS [®] BIO	BLUACT [®] BIO	ZINCO EDTA	
ACTINIDIA	40/30 gg prima dell'inizio del germogliamento	40-50 L/ha	40-50 L/ha	1 L/ha	600 L/ha

► PER LA CORRETTA APPLICAZIONE NELLE SPECIFICHE CONDIZIONI PEDOClimatiche e CULTURALI, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

pH (soluzione 1%)	4,9±0,5
Peso specifico (a 20°C)	1,16±0,02 kg/L

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d'acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto nella tabella dedicata a fine catalogo. Poiché la classificazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda all'etichetta del prodotto.

APPLICAZIONE:



CONFEZIONI:

20 L

AVVERTENZE

- Assicurare una bagnatura ottimale ed uniforme.
- Non utilizzare su piante di età inferiore ai 3 anni, deboli o non ben lignificate.
- Applicare in località con un insufficiente numero di ore di freddo ($T < 7,2^{\circ}\text{C}$).
- Si consiglia di applicare con temperatura ambientale superiore ai 5°C .
- Eseguire il trattamento quando si prevede assenza di piogge nelle 24-36 ore successive.
- Eventuali trattamenti con oli minerali vanno effettuati almeno 8-10 gg dopo l'applicazione di **BLUPRINS[®] BIO** + **BLUACT BIO** + **ZINCO EDTA**.
- Evitare la distribuzione (anche per "effetto deriva") su colture in attività vegetativa o sempreverdi (es. olivo, agrumi ecc).
- Per la preparazione della miscela nella botte, aggiungere nell'ordine: acqua (circa metà del volume finale), **ZINCO EDTA**, **BLUACT BIO**, **BLUPRINS[®] BIO**, ancora acqua fino al volume finale.
- Non lasciare la soluzione preparata nella botte e lavare a fondo l'intera attrezzatura dopo il trattamento.