Zip® Turf & Vivai

- INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
- Concime nazionale secondo il Dlgs 75/20210 e successive modifiche
- Prodotto ad azione specifica a base di microrganismi, studiato specificatamente per essere dato al suolo
- Composto da un consorzio di micorrize, batteri PGPR e funghi della rizosfera. La combinazione bilanciata dei diversi microrganismi ubiquitari agisce sull'area di attecchimento creando le condizioni ottimali per la germinazione del seme e la crescita delle plantule nelle prime e più critiche fasi di crescita. Una buona espansione di un sistema radicale forte assicura una rapida crescita, resistenza alle avversità ed uno sviluppo omogeneo
- I *Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Bacillus megatherium, Bacillus velezensis* e *Bacillus amyloliquefaciens* creano un ambiente sfavorevole allo sviluppo di microrganismi patogeni presenti nella rizosfera (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Sclerotinia* spp., *Rizoctonia* spp. e *Verticillium* spp.), permettono di aumentare l'accrescimento vegetativo e radicale della coltura influenzandone positivamente gli aspetti produttivi
- Facilita l'assorbimento del fosforo
- ZIP TURF & VIVAI è una polvere fine con un alto grado di adesività. Se miscelato con i semi, aderisce spontaneamente alla superficie dei semi in modo omogeneo

COMPOSIZIONE
ammendante compostato verde
contenuto in micorrize 1%
contenuto batteri della rizosfera 10^8 UFC/g
trichoderma: *Trichoderma harzianum* 10^6 UFC/g

FORMULAZIONE
polvere

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	EPOCA D'INTERVENTO
Tappeti erbosi	1 kg/3.000 metri quadri	Inserire 1 kg di prodotto ogni q.le di seme direttamente nella tramoggia
Vivai di orticole e ornamentali	1-1,5 kg/metro cubo di terriccio	Mescolare da 1 kg a 1,5 kg di prodotto ogni metro cubo di terriccio o 400 g in 100 kg
Frutticole, arboree	4-6 kg/ha	Distribuire localizzato nel solco d'impianto o direttamente sulle radici prima del trapianto
Vite (Barbatelle)	6 kg/ha (circa 6 kg per 5.000 barbatelle)	Bagnare preventivamente con Aminomix Vegetal il giorno precedente e successivamente ricoprire di prodotto. Distribuire uniformemente sulle radici delle barbatelle prima del trapianto
Frumento, Orzo, Avena, Segale, Farro, Lenticchia	0.5 kg/ha	Inserire il prodotto direttamente nella tramoggia con il seme
Mais, Sorgo	1.5 kg/ha	Inserire il prodotto direttamente nella tramoggia con il seme
Leguminose (come Fagiolo, Fava, Pisello Cece), oleaginose (come Soia, Girasole, Colza)	1 kg/ha	Inserire il prodotto direttamente nella tramoggia con il seme
Colture orticole (come Pomodoro, Melone, Finocchio, Cipolla...) ed Industriali (come Patata, Tabacco)	3 kg/ha	Distribuire al trapianto sulle radici o nel solco d'impianto

Si consiglia di proseguire la strategia impiegando nelle fasi successive il formulato liquido ZIP in associazione ad Aminomix Vegetal

SECCHIO
10 kg