

TIPO DI APPLICAZIONE

Come fertilizzante: applicare all’inizio dello sviluppo vegetativo, facendo seguire una seconda applicazione 1-2 settimane prima della fioritura.

Come induttore di resistenza: in condizioni di stress applicare ogni 10 gg. oppure (in funzione della coltura e delle avversità) secondo lo schema seguente:

DENTAMET®

COLTURA	DOSE	EPOCA D'INTERVENTO
Pero	600-700 g/hl 800 g/hl	Per via fogliare: all'apertura del fiore centrale e a fine fioritura. Ripetere in caso di rifioritura e immediatamente dopo ogni grandinata Per via fogliare: 20 gg prima della caduta foglie.
Kiwi	10 kg/ha 350-400 g/hl 700-800 g/hl	In fertirrigazione: 15 gg prima del germogliamento Per via fogliare: due interventi da germogli sviluppati a pre-fioritura Per via fogliare: in post-raccolta e 20 gg prima della caduta foglie
Vite e Uva da tavola	400-650 g/hl	Per via fogliare: in pre-fioritura, pre-chiusura del grappolo, invaiatura, 14 gg. prima della raccolta
Melo	400-650 g/hl 700-800 g/hl	Per via fogliare: da punte verdi ad intervalli di 14 gg. Per via fogliare: 20 gg prima della caduta foglie
Agrumi	600-700 g/hl	Per via fogliare: un trattamento in pre-fioritura, due interventi in autunno a distanza di 10-14 gg
Pomodoro, Peperone, Melanzana	3,5-5 kg/ha	Per via fogliare: 20 gg dopo il trapianto, ripetendo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Cipolla, Aglio, Bulbose da fiore	3,5-5 kg/ha	Per via fogliare: dalla 5° foglia fino a fioritura a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Melone, Anguria, Zucchini	3,5-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Carciofo e Crocifere (cavoli, broccoli, cavolfiore)	3,5-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Fragola	600-650g/hl	Per via fogliare: da post-trapianto (2-3 interventi preventivi)
Patata	3,5-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Frumento, Riso	3,5 kg/ha	Per via fogliare: da botticella a post-fioritura, n. 2 trattamenti anche in associazione ai trattamenti fungicidi o insetticidi
In Fertirrigazione	12-16 kg/ha	Dose da frazionare in 3-4 interventi, applicando il prodotto nella fase finale del turno

OSSERVAZIONI: non miscelare con formulati a reazione alcalina. Rispettare un intervallo di almeno 7 gg da applicazioni con olii minerali, dimetoato e dicofol. Associare ad un prodotto bagnante-adesivante

BIO-D

COLTURA	DOSE	EPOCA D'INTERVENTO
Pesco, Susino, Albicocco, Nettare, Ciliegio	700-750 g/hl 800-900 g/hl	Per via fogliare: a) bottoni rosa; b) caduta petali c) inizio allegagione; ripetere immediatamente dopo ogni eventuale grandinata Per via fogliare: 20 gg prima della caduta foglie e a completa caduta foglie
Vite e Uva da tavola	500-700 g/hl	Per via fogliare: germogli da 30 a 60 cm, in pre-fioritura e 14 gg. prima della raccolta
Melo	600-700 g/hl 800-900 g/hl	Per via fogliare: da punte verdi ad intervalli di 14 gg. Per via fogliare: in post-raccolta : 20 gg prima della caduta foglie.
Agrumi	600-700 g/hl	Per via fogliare: due trattamenti in pre-fioritura a distanza di 10-14 gg
Pomodoro, Peperone, Melanzana	4-5 kg/ha	Per via fogliare: 20 gg dopo il trapianto, ripetendo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Cipolla, Aglio, Bulbose da fiore	4-5 kg/ha	Per via fogliare: dalla 5° foglia fino a fioritura a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Carciofo	4-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Melone, Anguria, Zucchini	4-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
Fragola	650-700 g/hl	Per via fogliare: da post-trapianto (2-3 interventi preventivi)
Patata	4-5 kg/ha	Per via fogliare: da sviluppo vegetativo a distanza di 10-14 gg (2-3 interventi preventivi)
In Fertirrigazione	12-16 kg/ha	Dose da frazionare in 3-4 interventi, applicando il prodotto nella fase finale del turno di irrigazione

OSSERVAZIONI: Il prodotto può essere utilizzato in miscela a fungicidi, insetticidi o prodotti per la nutrizione di uso comune ad esclusione di rame ed olii. Impiegare nelle ore più fresche della giornata. Associare ad un prodotto bagnante-adesivante.



DIAGRO S.r.l.
Via Tonale, 15
24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
Tel. 035 582527 - Fax: 035 4239717
e-mail: info@diagro.191.it





BIO-D DENTAMET®

Induttori di resistenza
e
promotori delle difese naturali delle piante




DENTAMET®

Dentamet® è una miscela fertilizzante a base di zinco e rame complessata ad acido citrico (sottoforma di idracido), in grado di correggere rapidamente situazioni di carenza, anche gravi, di questi due importanti microelementi che risultano determinanti per il funzionamento del sistema enzimatico della pianta.

L'idracido di acido citrico, ottenuto per mezzo di un processo di fermentazione simile a quello che avviene in natura ad opera di alcuni funghi del suolo, svolge funzione complessante nei confronti dei due microelementi.

Il prodotto è assorbito per via fogliare e radicale, permanendo nella zona delle radici per circa 2 settimane.



COMPOSIZIONE	Rame (Cu) solubile in acqua	2,0 %
	Zinco (Zn) solubile in acqua	4,0 %
	Acido citrico	23,8%
	pH	2,5
FORMULAZIONE	liquido solubile	
PESO SPECIFICO	1.280 g/l	

MODALITA' DI AZIONE

Dentamet® si distingue per l'alto livello di compatibilità e per una rapida assimilazione nei tessuti vegetali. Il basso peso molecolare del complesso unito ad un valore di pH simile al pH fisiologico cellulare permette la correzione delle carenze con quantità minime di Zinco e Rame, con un elevato livello di efficienza fertilizzante e con un ridotto consumo energetico da parte della pianta..

Dentamet® stimola la formazione di sostanze naturali di difesa (pre-inibitine) con azione indotta di protezione biologica nei confronti di situazioni di stress determinate da avversità ambientali o da cause parassitarie (batteri e funghi).

Dentamet® per la sua origine naturale, è di impiego sicuro per l'uomo e l'ambiente ed è consentito nell'impiego in agricoltura biologica.

principali impieghi di **Dentamet®**




BIO-D

Bio-D è una miscela fertilizzante a base di zinco e manganese complessata ad acido citrico (sottoforma di idracido), in grado di correggere rapidamente situazioni di carenza, anche gravi, di questi due importanti microelementi che risultano determinanti per il funzionamento del sistema enzimatico e della fotosintesi.

L'idracido di acido citrico, ottenuto per mezzo di un processo di fermentazione simile a quello che avviene in natura ad opera di alcuni funghi del suolo, svolge funzione complessante nei confronti dei due microelementi.

Il prodotto è assorbito per via fogliare e radicale, permanendo nella zona delle radici per circa 2 settimane.



COMPOSIZIONE	Manganese (Cu) solubile in acqua	2,7 %
	Zinco (Zn) solubile in acqua	4,8 %
	Acido citrico	23,8%
	pH	2,5
FORMULAZIONE	liquido solubile	
PESO SPECIFICO	1.300 g/l	

MODALITA' DI AZIONE

Bio-D si distingue per l'alto livello di compatibilità e per una rapida assimilazione nei tessuti vegetali. Il basso peso molecolare del complesso unito ad un valore di pH simile al pH fisiologico cellulare permette la correzione delle carenze con quantità minime di Zinco e Manganese, con un elevato livello di efficienza fertilizzante e con una ridotta richiesta energetica da parte della pianta.

Bio-D stimola la formazione di sostanze naturali di difesa (pre-inibitine) con azione indotta di protezione biologica nei confronti di situazioni di stress determinate da avversità ambientali o da cause parassitarie (batteri e funghi).

Bio-D per la sua origine naturale, è di impiego sicuro per l'uomo e l'ambiente ed è consentito nell'impiego in agricoltura biologica.

principali impieghi di **BIO-D**

